

Cápsula de Permeabilidad Endoscopia

Instrucciones de Preparación

Acerca de la cápsula de permeabilidad:

Una cápsula de permeabilidad es una cápsula soluble que se ingiere para verificar la permeabilidad de su tracto gastrointestinal. Esto es especialmente importante antes de recibir una cápsula endoscópica, si su proveedor sospecha de estenosis/estrechamiento en el intestino delgado.

Detalles de la llegada:

- Por favor, regístrese entre: **07:45 - 08:00**
- Si llega después de las **08:00**, **NO** podremos proceder con la endoscopia con cápsula de permeabilidad.

Qué llevar y hacer antes de su procedimiento:

- Debería planificar estar en nuestras instalaciones durante **al menos 10 minutos**.
- Lea las instrucciones de preparación CUIDADOSAMENTE.

Medicamentos para bajar de peso/diabetes

- **Agonistas de GLP-1 (inyectable):** incluidos Mounjaro (tirzepatida), Zepbound (tirzepatida), Trulicity (dulaglutida), Victoza, Saxenda (liraglutida), Adlyxin (liraglutida), Ozempic (semaglutida), Wegovy (semaglutida), Bydureon BCise (exenatida de liberación prolongada), Byetta (exenatida), suspenda el medicamento inyectable una semana antes de su procedimiento.
- **Agonistas de GLP-1 (oral):** incluidos Rybelsus (semaglutida), suspenda el medicamento oral 24 horas antes de su procedimiento.

Si tiene diabetes, siga estas instrucciones:

- **Insulina de acción prolongada** (por ejemplo, Lantus, Basaglar, Semglee, Toujeo, insulina glargina): Disminuya la tasa basal a la mitad el día anterior y el día de su procedimiento.
- **Insulina de acción rápida y regular de acción corta** (por ejemplo, Lispro, Humalog, Admelog, insulina regular): si su nivel de azúcar en la sangre es alto y necesita tomar una corrección, tome la mitad o el 50 % de su corrección habitual. Esto se aplica al día anterior y al día de su procedimiento.
- **Bomba de Insulina:** Disminuya la tasa basal a la mitad el día anterior y el día de su procedimiento. No administre dosis en bolo.
- **Inhibidores de SGLT2:** incluidos Jardiance (empagliflozin), Brenzavvy (bexagliflozin), Glyxambi (empagliflozin/linagliptin), Invokamet (canagliflozin/metformin), Invokana (canagliflozin), Qtern (dapagliflozin/saxagliptin), Segluromet (ertugliflozin/metformin), Steglatro (ertugliflozin), Steglujan (ertugliflozin/sitagliptin), Synjardy (empagliflozin/metformin), Inpefa (sotagliflozin), Trijardy (empagliflozin/linagliptin/metformin), Xigduo (dapagliflozin/metformin), Farxiga (dapagliflozin), No los tome por cuatro días antes de su procedimiento.
- **Otros medicamentos orales e inyectables para diabéticos:** incluidos Glucophage (metformin), Glucotrol/Glynase Pres Tab/Micronase (glipizide), Amaryl (glimepiride), DiaBeta (glyburide), Tradjenta (linagliptin), Januvia (sitagliptin), Nesina (alogliptin), Onglyza (saxagliptin), Zituvio (sitagliptin), Actos (pioglitazone), Avandia (rosiglitazone) o combinaciones de estos, No los tome el día anterior ni el día de su procedimiento.
- **Controle su nivel de azúcar en la sangre a los intervalos habituales, y, además, de ser necesario:** si su nivel de azúcar en la sangre es inferior a 60, tome comprimidos de glucosa en cualquier momento antes de su procedimiento con un sorbo de agua.

Lista de Verificación Para Garantizar Una Preparación Adecuada

Para garantizar la finalización adecuada de su procedimiento, le sugerimos encarecidamente que **IMPRIMA** este documento y marque cada una de las instrucciones a medida que las complete.

5 días antes de su procedimiento:

- Por favor, póngas en contacto con nuestra clínica en el **303-604-5000** si se siente constipado. Le informaremos de cualquier requisito especial que podamos pedirle que haga.

Lista de verificación: 1 día antes de su procedimiento

- Puede tomar un desayuno regular por la **mañana**, pero después de las 09:00, empiece una dieta de **líquidos claros**.
- Si tiene **diabetes**, consulte las instrucciones para la diabetes arriba.
- Puede tomar líquidos claros **hasta las 22:00, pero NO alimentos sólidos**.
- DESPUÉS de las 22:00, no ingiera NADA**, ni siquiera medicamentos.
- NO fume ni mastique tabaco en las 24 horas previas al examen**, podría causar problemas con el procedimiento.
- Estas tablas le enseñarán **ejemplos de dietas de líquidos claros** de lo que puede y no puede beber:

LÍQUIDOS CLAROS - PUEDE BEBER:

Gatorade, Pedialyte, Powerade, Kool-Aid
Gatorade G2, Propel, Crystal Light
Paletas
Gelatina, jugo sin pulpa (por ejemplo, jugo de manzana)
Café negro
Té, agua
Refrescos transparentes (por ejemplo, Sprite, Ginger Ale)
Agua con gas

NO BEBA:

NO líquidos de color rojo o púrpura
NO leche ni cremas no lácteas
NO alcohol
NO caldo o sopa
NO jugo con pulpa (por ejemplo, jugo de piña)
NO líquido a través del cual no pueda ver
NO puré de manzana
NO batidos

Lista de verificación: el día de su procedimiento

- No tome** medicación **antes de las 10:00** el día del examen.
- NO llegue al examen después de las 08:00**. No podremos proceder si lo hace.
- En la clínica ingerirá la cápsula de permeabilidad. Recibirá una orden de rayos X para obtener una radiografía abdominal 24 horas después de ingerir la cápsula de permeabilidad. Dependiendo de estos resultados, su proveedor decidirá si podemos proceder con una cápsula endoscópica.
- Puede tomar líquidos claros 2 horas después de ingerir la cápsula.**
- Puede tomar comidas ligeras 6 horas después de ingerir la cápsula.**

Instrucciones/expectativas después del examen

- Tras ingerir la cápsula y hasta que se excrete, no debería acercarse a ningún campo electromagnético, como un dispositivo de resonancia magnética o un aparato de radio (ham).
- No se preocupe** si no excreta la cápsula, a veces ocurre.
- Dependiendo de los resultados de los rayos X, le contactaremos para discutir los pasos de cómo proceder. **Si no tiene noticias nuestras en 48 horas** desde el momento en que se realizó la radiografía, comuníquese con nuestra clínica: **303-604-5000**.

¡Felicitaciones, ha completado su preparación!

Requisitos de aviso de cancelación del procedimiento:

- La cancelación del procedimiento debe realizarse **tres (3) días hábiles antes de su cita**.
- Si no se proporciona el aviso previo requerido, se cobrará una **tarifa de cancelación**